



**Calf Lyte** kann variabel in Wasser oder Vollmilch / Milchaustauscher (MAT) aufgelöst werden. Es beeinträchtigt weder die Milchgerinnung noch die Milchverdauung.

**Calf Lyte** als **separate** Durchfalltränke in **Wasser** aufgelöst. Bieten Sie die Milchtränke abwechselnd mit **Calf Lyte** an.



	Uhrzeit Beispiel	Angebote Tränke
morgens	8 Uhr	2 Liter Milch oder MAT
vormittags	8-12 Uhr	<b>Calf Lyte</b> in 2 Liter Wasser
mittags	12 Uhr	2 Liter Milch oder MAT
nachmittags	12-16 Uhr	<b>Calf Lyte</b> in 2 Liter Wasser
abends	16 Uhr	2 Liter Milch oder MAT
abends	16-18 Uhr	<b>Calf Lyte</b> in 2 Liter Wasser

90g **Calf Lyte** immer frisch in 2 Litern lauwarmem Wasser auflösen und im Tränkeimer anbieten.

Bei starkem / wässrigem Durchfall kann es sinnvoll sein eine weitere **Calf Lyte** Tränke nach 18 Uhr anzubieten.

Bei stark reduziertem Saugreflex kann die erste Milchtränke durch eine **Calf Lyte** Tränke ersetzt werden um den Saugreflex wieder schneller herzustellen.



**Calf Lyte** kann variabel in Wasser oder Vollmilch / Milchaustauscher (MAT) aufgelöst werden. Es beeinträchtigt weder die Milchgerinnung noch die Milchverdauung.

**Calf Lyte** als Durchfalltränke in **Milch / Milchaustauscher** aufgelöst. Bei leichten Azidosen mit normalem Saugreflex



	Uhrzeit Beispiel	Angebote Tränke
morgens	8 Uhr	<b>Calf Lyte</b> in 2 Liter Milch oder MAT
mittags	12 Uhr	<b>Calf Lyte</b> in 2 Liter Milch oder MAT
abends	16 Uhr	<b>Calf Lyte</b> in 2 Liter Milch oder MAT

90g **Calf Lyte** in 2 Litern Milch / MAT auflösen und im Tränkeimer anbieten.

**Es muss freier Zugang zum Trinkwasser gewährleistet sein!**

Bei starkem / wässrigem Durchfall kann es sinnvoll sein eine weitere **Calf Lyte** Tränke, die in Wasser aufgelöst wurde, nach 18 Uhr anzubieten.

Dazu 90g **Calf Lyte** in 2 Litern lauwarmem Wasser auflösen und im Tränkeimer anbieten.